



เอกสารกำกับยา: ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

ยาแคปซูลชนิดแข็งไอแบรนท์
ความแรง 75 มิลลิกรัม, 100 มิลลิกรัม และ 125 มิลลิกรัม
พาลโบซีคลิบ (palbociclib)

โปรดอ่านเอกสารกำกับยานี้ทั้งหมดให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนเริ่มกินยาเพราะเอกสารนี้มีข้อมูลสำคัญสำหรับคุณ

- โปรดเก็บเอกสารกำกับยานี้ไว้ คุณอาจจำเป็นต้องอ่านข้อมูลนี้อีกครั้ง
- หากคุณมีคำถามใด ๆ เพิ่มเติม โปรดสอบถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
- ยานี้ให้ใช้สำหรับคุณเท่านั้น ห้ามให้ยานี้แก่ผู้อื่น
แม้ว่าจะมีอาการแสดงของโรคที่เหมือนกันกับอาการของคุณเพราะอาจเป็นอันตรายได้
- หากคุณมีผลข้างเคียงใด ๆ โปรดสอบถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล
ซึ่งรวมไปถึงผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับยานี้ ดูหัวข้อที่ 4

มีข้อมูลใดบ้างในเอกสารกำกับยานี้

1. ยาไอแบรนท์คือยาอะไรและใช้ในกรณีใด
2. คุณควรทราบสิ่งใดบ้างก่อนกินยาไอแบรนท์
3. วิธีการกินยาไอแบรนท์
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บรักษายาไอแบรนท์
6. สิ่งที่ต้องระวังอยู่ในกล่องและข้อมูลอื่น

1. ยาไอแบรนท์คือยาอะไรและใช้ในกรณีใด

ยาไอแบรนท์ (IBRANCE) เป็นยาที่ใช้ในการรักษามะเร็ง ซึ่งมี พาลโบซีคลิบ (palbociclib) เป็นตัวยาสำคัญ

พาลโบซีคลิบ (palbociclib) ทำงานโดยการปิดกั้นโปรตีนที่เรียกว่า cyclin-dependent kinase 4 และ 6 ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเติบโตของเซลล์และการแบ่งเซลล์

การปิดกั้นโปรตีนเหล่านี้สามารถชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งและทำให้การลุกลามของมะเร็งช้าลง

ยาไอบแรนซีใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมบางประเภท (hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative) ซึ่งได้แพร่กระจายออกไปเกินกว่าเนื้ออกเดิม และ/หรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น โดยจะให้ยานี้ร่วมกับยากลุ่ม aromatase inhibitor หรือยาฟุลเวสทรานท์ (fulvestrant) ซึ่งจะใช้เป็นการรักษามะเร็งโดยใช้ฮอร์โมน

2. คุณควรทราบสิ่งใดบ้างก่อนกินยาไอบแรนซี

ห้ามกินยาไอบแรนซีในกรณีต่อไปนี้:

- หากคุณแพ้ตัวยาพาลโบซีคลิบ (palbociclib) หรือแพ้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของยาไอบแรนซี (ดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6)
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้สูตรยาที่มีส่วนประกอบของเซนต์จอห์นส์เวิร์ต (St. John's Wort) ในขณะที่คุณกำลังใช้ยาไอบแรนซี

คำเตือนและข้อควรระวัง

พูดคุยปรึกษากับแพทย์ เกสัชกร หรือพยาบาลก่อนที่จะใช้ยาไอบแรนซี

คุณอาจมีความเสี่ยงสูงซึ่งจะเกิดการติดเชื้อในขณะที่กำลังใช้ยาไอบแรนซี เนื่องจากยาไอบแรนซีอาจลดจำนวนเม็ดเลือดขาวและอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง

โปรดแจ้งให้แพทย์ เกสัชกร หรือพยาบาลทราบหากคุณพบว่ามีอาการแสดงหรืออาการของการติดเชื้อ เช่น หนาวสั่นหรือไข้

คุณจะได้รับ การตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการรักษาเพื่อตรวจสอบว่ายาไอบแรนซีมีผลอย่างไรต่อเซลล์เม็ดเลือดของคุณ (เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด)

การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น

ห้ามใช้ยาไอบแรนซีในเด็กหรือวัยรุ่น (อายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า)

การใช้ยาอื่นร่วมกับยาไอแบรนซ์

ระวังการใช้ยาไอแบรนซ์ร่วมกับยาอื่น เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้ ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณกำลังใช้ยาอื่นร่วมด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาดังต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เมื่อใช้ร่วมกับยาไอแบรนซ์:

- โลปีนาเวียร์ (lopinavir) อินดินาเวียร์ (indinavir) เนลฟินาเวียร์ (nelfinavir) ริโทนาเวียร์ (ritonavir) เทลาพรีเวียร์ (telaprevir) และซาควินาเวียร์ (saquinavir) ซึ่งใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
- คลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) และเทลิโทรมัยซิน (telithromycin) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย
- วอริโคนาโซล (voriconazole) ไอทราโคนาโซล (itraconazole) คีโทโคนาโซล (ketoconazole) และโพซาโคนาโซล (posaconazole) ที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา
- เนฟาโซดอน (nefazodone) ที่ใช้เพื่อรักษาอาการซึมเศร้า

ยาดังต่อไปนี้อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียงสูงขึ้นเมื่อให้ยาร่วมกับยาไอแบรนซ์:

- ควินิดีน (quinidine) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้ในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับจังหวะการเต้นของหัวใจ
- โคลชิซิน (colchicine) ซึ่งใช้เพื่อรักษาโรคเกาต์
- พราวาสตาติน (pravastatin) และโรซิวาสตาติน (rosuvastatin) ซึ่งใช้ในการรักษาระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
- ซัลฟาซาลาซีน (sulfasalazine) ซึ่งใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
- อัลเฟทานิล (alfentanil) ซึ่งใช้เป็นยาสลบในการผ่าตัด เฟนทานิล (fentanyl) ซึ่งใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและยาชาในช่วงก่อนการทำหัตถการ
- ไซโคลสปอริน (cyclosporin) เอเวโรลิมีส (everolimus) ทาโครลิมีส (tacrolimus) และไซโรลิมีส (sirolimus) ซึ่งใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อป้องกันการปฏิเสธอวัยวะ
- ไดไฮโดรเออร์โกตามีน (dihydroergotamine) และเออร์โกตามีน (ergotamine) ซึ่งใช้เพื่อรักษาไมเกรน
- พิโมไซด์ (pimozide) ซึ่งใช้เพื่อรักษาโรคจิตเภทและโรคจิตเรื้อรัง

ยาดังต่อไปนี้อาจลดประสิทธิภาพของยาไอแบรนซ์:

- คาร์บามาเซพีน (carbamazepine) และเฟนิโทอิน (phenytoin) ซึ่งใช้เพื่อหยุดอาการชักหรือลมชัก
- เอนซาลูตามิด (enzalutamide) ซึ่งใช้เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
- ไรแฟมพิน (rifampin) ซึ่งใช้เพื่อรักษาวัณโรค (tuberculosis [TB])
- เซนต์จอห์นส์เวิร์ต (St. John's Wort)

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลที่มีความรุนแรงน้อย

การใช้ยาไอแบรอนซ์ร่วมกับอาหารและเครื่องดื่ม

หลีกเลี่ยงการกินผลไม้เปรี้ยวและการดื่มน้ำผลไม้เปรี้ยวในระหว่างที่ใช้ยาไอแบรอนซ์เนื่องจากอาจทำให้ผลข้างเคียงของยาไอแบรอนซ์มีอาการรุนแรงขึ้นได้

สตรีมีครรภ์ สตรีระหว่างให้นมบุตร และการเจริญพันธุ์

คุณไม่ควรใช้ยาไอแบรอนซ์หากคุณกำลังตั้งครรภ์

คุณควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้ยาไอแบรอนซ์

ปรึกษาเกี่ยวกับการคุมกำเนิดกับแพทย์หากมีความเป็นไปได้ใด ๆ
ว่าคุณหรือคู่ครองของคุณอาจเกิดตั้งครรภ์

หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร คิดว่าอาจเกิดตั้งครรภ์ หรือกำลังวางแผนที่จะมีบุตร โปรดขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยานี้

สตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ยานี้หรือคู่ครองฝ่ายชายควรใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เพียงพอ (เช่น การคุมกำเนิดที่มีการป้องกันสองชนิด เช่น การใช้ถุงยางและแผ่นครอบปากมดลูก (diaphragm)) ควรใช้วิธีการเหล่านี้ในระหว่างการรักษาและเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 3 สัปดาห์หลังจากที่สิ้นสุดการรักษาแล้วสำหรับฝ่ายหญิงและเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 14 สัปดาห์สำหรับฝ่ายชาย

การให้นมบุตร

คุณไม่ควรให้นมบุตรในระหว่างที่กำลังใช้ยาไอแบรอนซ์
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้ไอแบรอนซ์ถูกขับออกมาทางน้ำนมแม่หรือไม่

การเจริญพันธุ์

หากคุณกินยาไอแบรอนซ์เกินขนาด อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในเพศชาย

ดังนั้น ผู้ป่วยเพศชายอาจต้องพิจารณาที่จะเก็บรักษาเชื้ออสุจีก่อนที่จะใช้ยาไอแบรอนซ์

การขี้นยานพาหนะและควบคุมเครื่องจักรกล

การเหนื่อยล้าเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยมาก หากคุณรู้สึกว่เหนื่อยล้าผิดปกติ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขี้นยานพาหนะหรือควบคุมเครื่องจักรกล

ยาไอแบนรซ์มีส่วนประกอบของแลกโตส

ยานี้มีส่วนประกอบของแลกโตส (พบในนมและผลิตภัณฑ์จากนม)

หากแพทย์ของคุณแจ้งว่าคุณมีภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลบางชนิด โปรดติดต่อแพทย์ของคุณก่อนใช้ยานี้

3. วิธีการกินยาไอแบนรซ์

กินยาเ็นอย่างถูกต้องตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเสมอ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจ

ขนาดยาของไอแบนรซ์ที่แนะนำคือ 125 มิลลิกรัม โดยกินวันละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ตามด้วยการหยุดยาไอแบนรซ์เป็นเวลา 1 สัปดาห์

แพทย์ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบว่าควรกินยาไอแบนรซ์จำนวนกี่แคปซูล

หากคุณพบว่าเกิดผลข้างเคียงในขณะที่คุณใช้ยาไอแบนรซ์ (ดูหัวข้อที่ 4 “ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น”) แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาของคุณลงหรือหยุดการรักษาไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร ขนาดยานี้อาจลดลงไปเป็นความแรงของยาในขนาดอื่น ซึ่งมีให้เลือกในขนาด 100 มิลลิกรัมหรือ 75 มิลลิกรัม

กินยาไอแบนรซ์วันละครั้งเป็นเวลาเดียวกันทุกวันพร้อมอาหาร โดยจะดียิ่งขึ้นหากกินพร้อมมื้ออาหาร โปรดกลืนแคปซูลทั้งเม็ดพร้อมน้ำหนึ่งแก้ว อย่าเคี้ยวหรือบดแคปซูล อย่าเปิดแคปซูล

หากคุณกินยาไอแบนรซ์เกินขนาด

ในกรณีที่กินยาไอแบนรซ์เกินขนาด ให้ไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลในทันที อาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน

โปรดนำกล่องและเอกสารกำกับยานี้ไปด้วยเพื่อที่แพทย์จะได้ทราบว่ากินยาชนิดใด

หากคุณลืมกินยาไอแบนรซ์

หากคุณลืมนินยาหนึ่งครั้งหรืออาเจียน ให้กินยาครั้งต่อไปตามปกติตามตารางการกินยา
อย่ากินยาโดยเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าเพื่อทดแทนแคปซูลที่ลืมนิน

หากคุณหยุดกินยาไอแบรนท์

ห้ามหยุดกินยาไอแบรนท์ เว้นเสียแต่ที่แพทย์จะแจ้งให้คุณหยุดใช้

หากคุณมีคำถามใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทุกชนิด ยานี้สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกราย:

หากคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น: ไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย หายใจไม่ออก มีเลือดออก หรือเกิดรอยช้ำได้ง่าย
ซึ่งอาจเป็นอาการแสดงของความผิดปกติของเลือดที่ร้ายแรง ติดต่อแพทย์ของคุณทันที

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่เกิดจากยาไอแบรนท์นั้นอาจรวมไปถึง:

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยมาก (อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยมากกว่า 1 ใน 10 ราย):

การติดเชื้อ

จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดลดลง

รู้สึกเหนื่อยล้า

ความรู้สึกอยากอาหารลดลง

การอักเสบของปากและริมฝีปาก (ปากอักเสบ) คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
ผื่น

ผมร่วง

อ่อนเพลีย

มีไข้

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย (อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยสูงถึง 1 ใน 10 ราย):

มีไข้ร่วมกับการมีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวลดลง (ไข้เหตุนิวโทรฟิลในเลือดต่ำ [febrile neutropenia])

ตามัว มีน้ำตาเพิ่มขึ้น ตาแห้ง

ผลการตรวจเลือดในระดับผิดปกติ
การรับรสเปลี่ยนไป (การรับรสผิดปกติ [dysgeusia])
เลือดกำเดาไหล
ผิวแห้ง

การรายงานผลข้างเคียง

หากคุณมีผลข้างเคียงใด ๆ โปรดพูดคุยปรึกษากับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ ซึ่งรวมไปถึงผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับยานี้

5. วิธีเก็บรักษายาไอแบรนท์

เก็บยานี้ให้ห่างจากสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุที่ได้ระบุไว้บนขวดยาหรือบนแผงบลิสเตอร์และบนกล่อง ซึ่งอยู่หลังคำว่า “EXP” วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ไม่จำเป็นต้องเก็บยานี้ในสภาวะพิเศษใด ๆ

ห้ามใช้ยานี้หากคุณสังเกตเห็นว่ากล่องได้รับความเสียหายหรือแสดงให้เห็นร่องรอยการแกะ

ห้ามทิ้งยาใด ๆ ลงไปในท่อน้ำทิ้งหรือในถังขยะในบ้านเรือน
สอบถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทิ้งยาที่คุณไม่ใช้อีกต่อไป
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสภาพแวดล้อม

6. สิ่งที่ต้องบรรจุอยู่ในกล่องและข้อมูลอื่น

ยาไอแบรนท์มีส่วนประกอบใดบ้าง

- ตัวยาสำคัญคือ พาลโบซิคลิบ (palbociclib) ยาแคปซูลชนิดแข็งไอแบรนท์มีหลายความแรง
- ยาแคปซูลชนิดแข็งไอแบรนท์ขนาด 75 มิลลิกรัม: แต่ละแคปซูลประกอบไปด้วย พาลโบซิคลิบ (palbociclib) ขนาด 75 มิลลิกรัม
- ยาแคปซูลชนิดแข็งไอแบรนท์ขนาด 100 มิลลิกรัม: แต่ละแคปซูลประกอบไปด้วย พาลโบซิคลิบ (palbociclib) ขนาด 100 มิลลิกรัม

- ยาแคปซูลชนิดแข็งไอแบรินซ์ขนาด 125 มิลลิกรัม: แต่ละแคปซูลประกอบไปด้วย พาลโบซิคลิบ (palbociclib) ขนาด 125 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้:
ส่วนประกอบของแคปซูล: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, sodium starch glycolate type A, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate เปลือกแคปซูล: gelatin, red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172), titanium dioxide (E171) หมึกพิมพ์: shellac, titanium dioxide (E171), ammonium hydroxide (28% solution), propylene glycol, simeticone (ดูหัวข้อที่ 2 “ยาไอแบรินซ์มีส่วนประกอบของแล็กโทส”)

ยาไอแบรินซ์มีรูปร่างลักษณะอย่างไรและมีสิ่งใดบรรจุอยู่ในกล่อง

- ยาไอแบรินซ์ขนาด 75 มิลลิกรัมเป็นแคปซูลแข็ง ทึบแสง โดยตัวแคปซูลเป็นสีส้มอ่อน (พิมพ์ข้อความ “PBC 75” สีขาว) และฝาปิดแคปซูลมีสีส้มอ่อน (พิมพ์ข้อความ “Pfizer” สีขาว)
- ยาไอแบรินซ์ขนาด 100 มิลลิกรัมเป็นแคปซูลแข็ง ทึบแสง โดยตัวแคปซูลเป็นสีส้มอ่อน (พิมพ์ข้อความ “PBC 100” สีขาว) และฝาปิดแคปซูลมีสีน้ำตาล (พิมพ์ข้อความ “Pfizer” สีขาว)
- ยาไอแบรินซ์ขนาด 125 มิลลิกรัมเป็นแคปซูลแข็ง ทึบแสง โดยตัวแคปซูลเป็นสีน้ำตาล (พิมพ์ข้อความ “PBC 125” สีขาว) และฝาปิดแคปซูลมีสีน้ำตาล (พิมพ์ข้อความ “Pfizer” สีขาว)

ยาไอแบรินซ์บรรจุในแผงบลิสเตอร์ที่มียาแคปซูลแข็งจำนวน 7 แคปซูลหรือ 21 แคปซูลต่อกล่อง หรือบรรจุในขวดพลาสติกที่มียาแคปซูลแข็งจำนวน 21 แคปซูลต่อขวด

อาจวางจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ยาในบางขนาดเท่านั้น

ชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

คำเตือน (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 03 พฤษภาคม 2562

PIL Title: Palbociclib

PIL Revision no.: 2.3

PIL Date: May 03, 2019

Country: Thailand

Reference: LPD rev. no. 2 and EU SmPC, date: January 24, 2018

Country: Thailand