

อะทีโซลิซูแมบ

ขนาด 60 มิลลิกรัม ใน 1 มิลลิลิตร

ชนิดสารละลายเข้มข้นสำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ

ชื่อการค้า Tecentriq (ทีเซินทริค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะทีโซลิซูแมบ (atezolizumab) เป็นยาในกลุ่มสารภูมิต้านทาน (monoclonal antibody)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอด
- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเต้านม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากภาวะต่อไปนี้ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับยานี้

- ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- กำลังให้น้ำนมลูก หรือมีแผนจะให้น้ำนมลูก
- ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- เคยปลูกถ่ายอวัยวะ
- โรคปอด หรือการหายใจ
- โรคตับ
- โรคระบบประสาท
- กำลังรักษาอาการติดเชื้อใดๆ อยู่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์จะให้ยานี้โดยหยดเข้าเส้นเลือดดำนาน 30 นาที ถึง 60 นาทีต่อครั้ง
- ท่านจะได้รับยานี้ทุกๆ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ ตามแพทย์สั่ง

3.2 หากลืมไปฉีดยา ควรทำอย่างไร

- หากท่านลืมนัด ให้ท่านติดต่อแพทย์โดยด่วนเพื่อปรับตารางการให้ยาใหม่

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้ป่วยหญิงให้คุมกำเนิดตลอดเวลาที่ได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากหยุดยา
- หยุดให้นมลูกระหว่างได้รับยานี้และต่อไปอีกอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากหยุดยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์หรือรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นผด
- ไอ หรืออาการไอเรื้อรังที่ไม่ดีขึ้น หายใจสั้น เจ็บหน้าอก
- ตัวเหลืองตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง เจ็บชายโครงขวา เชื่องซึม ปัสสาวะสีเข้ม(สีชา) เลือดออกง่ายกว่าปกติ หิวน้อยลง
- ท้องเสีย ถ่ายเหลว ถ่ายบ่อย ถ่ายปนเลือด อุจจาระมีสีดำหรือเหนียว ปวดท้องรุนแรง
- ปวดหัวแบบผดผื่น เห็นอ้อยล่า น้ำหนักตัวผดผื่น หน้ามืดหรือเป็นลม หิวบ่อยหรือหิวบ้างน้อยกว่าปกติ ผม่วรง อารมณ์ขึ้นลง หนาว ท้องผูก เสียงทุ้มต่ำ ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง

- กล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรง ชาหรือเสียวที่ปลายมือปลายเท้า มีไข้ สับสนมึนงง อารมณ์แปรปรวน พฤติกรรมแปรปรวน ไม่สู้แสง คอแข็ง
- ตาพร่า ภาพซ้อน หรือการมองเห็นผิดปกติ
- มีไข้ ไอ ปัสสาวะบ่อย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปวดแสบขณะปัสสาวะ

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- เหนื่อยง่าย
- ออยากอาหารลดลง
- คลื่นไส้
- ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
- มีไข้
- ท้องผูก
- หายใจสั้น
- ไอ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่า
ผลิตภายใต้ บริษัท เอฟ ฮอฟมันน์ – ลา โรซ จำกัด
สวิสเซอร์แลนด์
ผู้นำเข้า บริษัท โรซ ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด กรุงเทพฯ
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ใช้ยานี้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยา