

## ทาลิโดไมด์ 50 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ทาลิโดไมด์ (thalidomide) เป็นยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลไมอีโลมา ซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชื่อว่าพลาสมา แบ่งตัวมากผิดปกติ

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เมื่อตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ควรตรวจวัดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดในเดือนแรกและหลังจากเริ่มรับประทานยาได้ 3 เดือน และควรตรวจวัดทุก 3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ

### 3. วิธีการใช้ยา

**3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

#### 3.2 หากลืมหินยาควรทำอย่างไร

- 1.3.1.3.1 Pg. 1 ถ้าลืมหินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมหินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้ชายที่ได้รับยานี้ ต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการรักษาและต้องใช้ต่อไปอีก 1 เดือนหลังจากหยุดใช้ยานี้
- ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
  - ต้องได้รับการตรวจการตั้งครรภ์จากแพทย์ดังนี้
    - ก่อนการรักษา
    - ทุก 4 สัปดาห์ระหว่างการรักษา
    - 4 สัปดาห์หลังหยุดการรักษา
- หากประจำเดือนผิดปกติ หรือประจำเดือนขาดควรตรวจการตั้งครรภ์และปรึกษาแพทย์
- อย่าให้นมบุตรระหว่างใช้ยานี้ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลว่ายานี้ผ่านน้ำนมไปสู่เด็กที่ติ่มนมแม่ได้หรือไม่
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ มีแผลในปาก หรืออาการอื่น ๆ ของการติดเชื้อ
- มีอาการเหน็บชา เจ็บตามมือและเท้า
- ปวดเท้าหรือเท้าบวมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน่อง

- ปวดหน้าอกกลามมาที่แขน คอ กราม หลัง หรือท้อง มีเหงื่อออกและหายใจลำบาก รู้สึกไม่สบายหรืออาเจียน
- ลำบากในการมองหรือพูดลำบาก
- มีเลือดออกหรือจ้ำเลือดโดยไม่มีอาการบาดเจ็บ

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันที

- ปากแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ท้องร่วง ท้องผูก ท้องอืด
- ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
- ง่วงซึม วิงเวียน ความดันโลหิตต่ำเนื่องจากเปลี่ยนอิริยาบถ

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือห้องครัว
- ควรแกะยานี้เมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต TTY Biopharm Co., Ltd. Chungli Factory, 838, Chung Hwa Rd., Sec. 1., Chungli Dist., Taoyuan City., 32069, Taiwan R.O.C.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไตหัวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด

เลขที่ 1 อาคารอีสทอเวเตอร์ ชั้นที่ 16

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตห้วยขวาง กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26 กันยายน 2560

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร**