

# พริกาบาลิน 25, 75, 150 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าพริกาบาลิน (pregabalin) เป็นยาในกลุ่มที่มีโครงสร้างคล้ายสารสื่อประสาทในสมอง

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท โรคลมชัก โรควิตกกังวลทั่วไป กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- แพ้น้ำตาลนมหรือแลคโตส
- มีนงงและง่วงนอนผิดปกติ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
- โรคหัวใจล้มเหลว หรือมีประวัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ
- หญิงมีครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้ เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ได้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
- หญิงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
- ยานี้ อาจเสริมฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ และยาลดแรงชี้แปม ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ร่วมกัน
- ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับยาออกซีโคโดน เพราะอาจทำให้เกิดความบกพร่องทางการรับรู้และการเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อ

## 3. วิธีใช้ยา

**3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์จะเป็นผู้กำหนดขนาดยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
- แพทย์อาจให้กินยานี้วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง และควรกินยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- ให้กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ง่วงซึม, มีนงง, กระสับกระส่าย และกระวนกระวาย เป็นต้น ให้นำกล่องหรือขวดยาดัดตัวไปพร้อมกับให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
- ไม่ควรขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานกับเครื่องจักรกลหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการผลัดตกจากที่สูง
- ผู้ป่วยบางรายที่เป็นเบาหวาน อาจมีน้ำหนักขึ้นระหว่างใช้ยานี้ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อปรับขนาดยาเบาหวาน

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- มีนงง ง่วงนอนผิดปกติ
- เดินเซ ร่างกายทำงานไม่ประสานกัน พูดไม่ชัด สูญเสียความทรงจำ สมดุลการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวผิดปกติ
- สายตามัวชั่วคราว เห็นภาพซ้อน
- ปากแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ไม่สบายท้อง ท้องผูก
- บวมตามแขนขา
- ออยากอาหาร และน้ำหนักเพิ่ม

## 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแกะยาทิ้งไว้เป็นเวลานานก่อนกิน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่ายบริษัท ที. โอ. เคมีคอลส์ ( 1979 ) จำกัด

280 ซอยสบายใจ ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

โทร 02-2756053-9 โทรสาร 02-2777350

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม 2

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**